

臨證指南醫案

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾痺

瘧

瀉

11

[illegible]

臨證指南醫案卷六

許關李大瞻翰聞

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

鬱

于五鬱損心陽陽墜入陰爲淋濁由情志內傷卽爲陰虛  
致病見症亂治最爲庸劣心藏神神耗如憤諸數失司  
非偏寒偏熱藥治必得開爽冀有向安服藥以草木功  
能恐不能令其歡悅妙香散

心脾氣  
結神志  
不清

陸二 人參 桔梗 烏藥 木香 各三分磨汁

又 夜服白金丸

又 久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參 石菖蒲 龍骨 棗仁

遠志 茯神

心下痞  
結

胡六 悲泣乃情懷內起之病病生於腎此象癰大按之堅硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連 乾薑 半夏 薑汁

茯苓 連皮瓜蒌

心  
結內

李六 老年情志不適鬱則少火變壯火知飢脘中不爽口

舌糜。心脾營損。木火劫燄精華。肌肉日消。惟怡悅開  
爽。內起鬱熱。可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱  
矣。

金石斛 連翹心 炒丹皮 經霜桑葉

川貝 茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參 川連 炒丹皮 生白芍

小麥 茯神

某 腕痛已止。味酸。乃肝腎也。

金石斛 黑山梔 丹皮 半夏麴

橘紅

枇杷葉

某初起左邊麻木舌強筋弔腦後痠痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致

羚羊角

連翹心

鮮生地

玄參

石膏蒲

鬱金汁

某氣鬱不舒木不條達緩則少寬

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱成熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫胆湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈

三脈虛瀉情懷失暢肝脾氣血多鬱半載不愈難任峻

劑議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中官虛寒爲泥。

吳氏勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宜補。

鈎藤

生香附

丹皮

桑葉

神麴

白芍

茯苓

廣皮

葉氏

悵鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和藥。



栝子仁

二錢

歸身

二錢

生白芍

一錢

小川連

三錢

川棟子

一錢

某

惱怒肝鬱思慮脾傷胃氣不消。寤不成寐。宗薛氏法

治之

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏

隱情曲意不伸。是爲心疾。此草木攻病。難以見長。乃

七情之鬱損。以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神效紫丸

程 脈弦澹。外寒內熱。齒痛舌乾無寐。乃肝脾鬱結不舒。

鬱金 鈎藤 丹皮 夏枯草

生香附 薄荷 廣皮 茯苓

肝 吳 一 操持過動。肝胆陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮 黑山梔 薄荷梗 鈎藤

廣皮 白芍 茯苓 神麴

陸 二 鬱傷筋。脹心痛。

鈎藤 生香附 鬱金 白蒺藜

丹皮 薄荷 廣皮 茯苓

肝 王 三 勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便溏。風水侮土。前方

既效。與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁杏仁當歸薑棗湯法

肝陽  
火升

朱三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有

實脇冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火  
但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之  
合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙四醫効日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飽肝陽

上管風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣從肝胆相火非無據矣。

生地 阿膠 玄參 丹參

川斛 黑櫨豆皮

胆脾氣  
血虧

朱氏 脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣。

上衝此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循胞脈遂痺。治以泄少陽補太陰。氣血流利鬱熱可解。

人參 柴胡 當歸 白朮

丹皮 甘草 茯苓

木火上升  
喉腫

吳三 脈弦滑數。頸項結癭。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆

厚

情志鬱勃。肝胆相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制情懷之陽。是以藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

木火上升  
肺不降

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。腕中窄隘不舒。脹及

背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫

令鬱痺綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

張左大弦數。頭目如蒙。背俞脹。都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃。頭目已清。而膈暖氣頗覺穢濁。此肝胆厥陽。由胃系上冲所致。丹溪謂上升之氣。自肝而出。是其明徵矣。

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱生  
清上焦

吳氏氣血鬱滯。久乃化熱。女科八脈失調。漸有經阻。癥帶諸疾。但先治其上。勿滋膩氣機。

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

火土 痰

徐氏 火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽帶

下不已固奇經通補陽明及養肝熄風展轉未能却病  
病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢早

上淡鹽湯送四服

熱

虞三脈數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮 黑山梔 茯神

鬱傷

王三痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空澗哈達不已議與

鬱損  
絡痰飲  
阻氣

血絡  
痺右脇  
痛

胃藥 金匱麥門冬湯

陸二  
五病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇  
之間常有不舒之象此氣血內鬱少展支脉中必有痰  
飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神 鬱金 橘紅 遠志

石菖蒲 丹參 琥珀 竹瀝法力

趙六  
二脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛  
呼吸不利卧着不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚

鬱金 降香



肝熱傷  
肝陰

王女陰虛。齒衄腸血。未出閣。鬱熱為多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

肝腎熱

張六情志連遭鬱勃。腦陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。心動

悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在至陰。鹹補苦泄。是為醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液  
渴  
無

許厥陰少陰臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣。

外來之偏耳

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

栢子仁

茯神

絡氣  
血鬱

韻五

久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫腹膨。膚腠無汗。用藥務在宣通五鬱六鬱大旨。

香附汁

白茯苓

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熟。腕脇痺悶不通。常有風疹腹痛。癢痺

已深。發時宜用通聖一劑。平時以通調氣熱之鬱。

土瓜萆皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

桃仁 杏仁

楊驚惶忿怒。都主肝陽上冒。血沸氣滯。瘀濁宜宣通以就下。因誤投止塞。舊瘀不清。新血又瘀絡中。匝月屢屢反覆。究竟肝胆氣血皆鬱。仍宜條達宣揚。滿瘍在肌。得體中稍健設法。

旋覆花 新絳 青葱管 炒桃仁 栝子仁

趙氏癰癰寒熱盜汗。腕中痠聚。經期不來。大便溏。喘咳減食。春深至冬未痊。此乃鬱損成勞。難治之症。

香附 丹皮 歸身 白芍

川貝 茯苓 牡蠣 夏枯草

胡氏頭項結核。晝夜寒熱盜汗。此乃憂鬱不解。氣血皆虛。倘若經阻。便難調治。

炒當歸

炒白芍

炙草

廣皮

茯神

釣藤

南棗

張氏據說。喪子悲哀。是情志中起。因鬱成勞。知飢不能食。內珠忽陷。忽脹。兩脇忽若刀刺。經先期。色變瘀紫。半年來醫藥無效者。情懷不得解釋。草木無能為矣。

人參

當歸

生白芍

炙草

肉桂

炒杞子

茯苓

南棗

素問六元正紀大論。言五鬱之發。乃因五運之氣有

太過不及。遂有勝復之變。由此觀之。天地且有鬱而  
況於人乎。故六氣着人。皆能鬱而致病。如傷寒之邪。  
鬱於衛。鬱於營。或在經。在腑。在臟。如暑濕之蘊結在  
三焦。瘟疫之邪。客於募原。風寒濕三氣雜感而成痺  
症。總之邪不解散。卽謂之鬱。此外感六氣而成者也。  
前人論之詳矣。今所輯者。七情之鬱居多。如思傷脾。  
怒傷肝之類是也。其原總由於心。因情志不遂。則鬱  
而成病矣。其症心脾肝胆爲多。案中治法。有清泄上  
焦鬱火。或宣暢少陽。或開降肺氣。通補肝胃。泄胆補  
脾。宣通脈絡。若熱鬱至陰。則用解補苦泄種種治法。

未能按症分析詳論。今舉其大綱。皆因鬱則氣滯。氣滯久則必化熱。熱鬱則津液耗而不流。升降之機失度。初傷氣分。久延血分。延及鬱勞沉疴。故先生用藥大旨。每以苦辛涼潤宣通。不投燥熱。歛滯呆補。此其治療之大法也。此外更有當發明者。鬱則氣滯。其滯或在形軀。或在臟腑。必有不舒之現症。蓋氣本無形。鬱則氣聚。聚則似有形。而實無質。如胸膈似阻。心下虛痞。脅脹背脹。腕悶不食。氣瘕攻衝。筋脈不舒。醫家不察。誤認有形之滯。放膽用破氣攻削。迨至愈治愈劇。轉方又屬呆補。此不死於病。而死於藥矣。不知情

志之鬱。由於隱情曲意不伸。故氣之升降開闔樞機不利。雖內經有泄折達發奪五鬱之治。猶慮難獲全功。故疏五過論有始富後貧。故貴脫勢。總屬難治之例。蓋鬱症全在病者能移情易性。醫者構思靈巧。不重在攻補。而在乎用苦泄熱。而不損胃。用辛理氣。而不破氣。用滑潤濡燥澀。而不滋膩氣機。用宣通而不擾苗助長。庶幾或有倖成。若必欲求十全之治。則惟道家有一言可以蔽之曰。欲要長生。先學短死。此乃治鬱之金丹也。華岫雲

# 肝火

風火上

秦氏

年前肝風眩暈。主以涼血分。和陽熄風。一年未發。今歲正月春寒。非比天暖開泄。此番病發。必因勞怒觸動情志。至於嘔逆微冷。條熱交丑寅。漸作耳鳴咽痺。食納久留腕中。想少陽木火盛於寅。膽脈貫耳。犯逆之威。必向陽明而後上。憑諸竅。脈右濇大。胃逆不降。食味不甘。而腕中逆亂。薰蒸日熾。營血內耗。無以養心。斯寤不肯寐。心搖蕩漾。有難以鳴狀之象。今頭重腕痺。全是上焦爲木火升騰。阻遏清陽。前方滋清血藥居多。必不奏功。



今議湯劑方。以苦降其逆。辛通其痺。然湯宜小。其製度。以久病體虛。初春若此。冬藏未爲堅固。可知其丸劑當以局方龍薈丸。暫服半月再議。

連翹

一錢

黑梔皮

一錢

羚羊角

一錢

鮮菊葉

三錢

紫苑

二錢

鬱金

八分

大杏仁

去皮尖勿研六粒

土瓜萸皮

一錢

鮮菖蒲根

四分

午服

沈女

腹痛少減。嘔逆已止。上焦熱。下焦冷。肝陽尙未和平。

擬進當歸龍薈丸法。

當歸

龍胆草

川楝子

蘼薈

川連

吳萸

大茴

黃氏 肝膽風火上鬱。頭面清空之筋掣不和。治以清散。

羚羊角 犀角 山梔 連翹

瓜蒌皮 荷葉梗 薄荷梗 青菊葉

鄭氏 驚風神迷。經脈抽痛。脹悶不欲納食。一月經期四至。

此證傷氣血成病。龍膏丸二錢五分三服。

葉氏 厥陽擾亂神明。經色已黑。肢冷面青便秘。

龍膏丸一錢二分十服。

關氏 誦讀吟咏。身雖靜坐。而心神常動。凡五志之動皆陽。

陽胃無制。清靈遂蒙。易旨以蒙乃外加之義。述病發之

時。頭中欲掐。腕欲撫摩。二便必不自利。此腑氣之窒。由

勞心陽動不火  
上蒙

乎肝胆厥逆起見矣。議從手經上焦治。

羚羊角

連翹心

玄參

石膏蒲根

鬱金

麥冬

竹葉

氣火鬱  
厥痛

唐女

脈左瀯右弦。氣火不降。胸脇隱痛。腕不爽。最慮失血。

川貝

山梔

丹皮

鬱金汁

鈎藤

瓜蒌皮

茯苓

橘紅

又氣火上鬱。腕中窒痛。嘔涎。先以開通壅遏。

香豉

瓜蒌皮

山梔

鬱金

竹茹

半夏麴

杏仁

葛 噤怒喧嚷。氣火逆飛。致血痺咽痛。食物厭惡。耳前後

達肩閃刺議解少陽

夏枯草

丹皮

桑葉

鈎藤

山梔

地骨皮

肝腎虛風陽主升

朱五

頭痛神煩。忽然而至。五行之速。莫如風火。然有虛實

內外之因。非徒發散苦寒爲事矣。如向有肝病。目疾。夜

明。是陰氣久傷體質。今厥陰風木司天。春深發泄陽氣

暴張。卽外感而論。正內經冬不藏精。春必病溫。育陰可

使熱清。大忌發散。蓋陰根久傷。表之再傷。陽劫津液。仲

景謂一逆尙引日。再逆促命期矣。余前主阿膠雞子黃

湯。佐地冬。壯水。芍甘培土。亟和其厥陽衝迎之威。鹹味

入陰。甘緩其急。與內經肝病三法恰合。今已入夏三日。虛陽條上。煩躁頭痛。當大滋腎母。以甦肝子。補胃陰。以杜木火乘侮。旬日不致反覆。經月可望全好。

人參      熟地      天冬      麥冬

龜膠      阿膠      北味      茯神

陸      鼻左竅有血。左肩胛臂痛。皆君相多動。營熱氣偏。脈得右虛左數。先以清肝通絡。

丹皮      山梔      羚羊角      夏枯草

蚕沙      然藤      連翹      青菊葉

肝者將軍之官。相火內寄。得真水以涵濡。真炁以制。

伏。木火遂生生之機。本無是症之名也。蓋因情志不舒。則生鬱。言語不投。則生嗔。謀慮過度。則自竭。斯罷極之本。從中變火。攻衝激烈。升之不熄。爲風陽抑而不透。爲鬱氣。腕脇脹悶。眩暈猝厥。嘔逆淋閉。狂躁見紅等病。由是來矣。古人雖分肝風肝氣肝火之殊。其實是同一源。若過鬱者宜辛宜涼。乘勢達之。爲安過升者宜柔宜降。緩其旋擾。爲先。自竭者全屬乎虛。當培其子母之臟。至於犯上侮中。乘下諸累。散見各門。可攷。

邵新甫

# 不寐

倪 多痛陽升陰液無以上注。古澗赤絳煩不成寐。當益

腎水以制心火。

鮮生地 玄參 麥冬 菉豆皮

銀花 竹葉心

吳 少陽鬱火不寐。

丹皮 半夏 鈎藤 桑葉

茯苓 橘紅

程氏 上晝氣逆填腕。子夜寤不肯寐。乃陽氣不降。請用溫

陽踴脈  
虛

膽湯 溫膽去思實加金斛 滾痰丸二錢五分

顧四鬚鬢已蒼面色已光亮操心煩勞陽上升動痰飲亦得  
上溢靈樞云陽氣下交入陰陽踴脈滿令人得寐今氣  
越外泄陽不入陰勉飲酒醴欲其神昏假寐非調病之  
法程凡中年已後男子下元先損早上宜用八味丸暇  
時用半夏秋米湯

某 陽不交陰夜卧寐躁 小半夏湯

趙氏 嘔吐眩暈肝胃兩經受病陽氣不交於陰陽踴穴空  
寤不肯寐 靈樞方半夏秋米湯主之

又 接用人參溫膽湯



雜考

某二脈滿不能充長肌肉夜寐不適脾管消索無以灌溉

故耳當用歸脾湯意溫之

嫩黃芪 於朮 茯神 遠志 棗仁

當歸 炙草 桂圓 新會皮

胆液斷  
陽升虛

某肝陽不降夜無寐進酸棗仁法

棗仁 知母 炙草 茯神

小麥 川芎

某不寐六十日溫胆諸藥不效嘔疾不適明係陽升不

降用金匱酸棗仁湯

棗仁 知母 茯苓 川芎 炙草

陳 陰精走泄復因洞瀉重亡津液致陽暴升胃逆食入欲嘔神識不靜無寐議酸棗仁湯

棗仁 五錢

炙草 五分

知母 二錢

茯苓 二錢

某三寤不成寐食不甘味脛羸脈細數清陰液內耗厥陽外越化火化風燔燥煽動此屬陰損最不易治姑與仲景酸棗仁湯

棗仁

炒黑勿研三錢

知母

牛一錢

雲茯神

三錢

生甘草

五分

川芎

五分

田 臟液內耗心腹熱灼陽氣不交於陰陽蹠穴空令人寤不成寐靈樞有半夏秫米法但此病乃損及肝腎欲

求陽和須介屬之醢佐以酸收甘緩庶幾近理

龜膠

淡菜

熟地

黃柏

茯苓

黃肉

五味

遠志

又

醢苦酸收已效下焦液枯須填實肝腎

龜鹿膠

熟地

茯苓

天冬

黃肉

五味

茯苓

羊內腎

不寐之故雖非一種總是陽不交陰所致若因外邪而不寐者如傷寒瘧疾等暴發營衛必然窒塞升降必然失常愁楚呻吟日夜難安當速去其邪按外即所以安內也若因裏病而不寐者或焦煩過度而難

宮內燃從補心丹及聚仁湯法或憂勞憤鬱而耗損  
心脾宗養心湯及歸脾湯法或精不凝神而龍雷震  
蕩當壯水之主合靜以制動法或肝血無藏而魂搖  
神漾有鹹補甘緩法胃病則陽蹻穴滿有靈樞半夏  
秫米湯法膽熱則口苦心煩前有溫胆湯先生又用  
桑葉丹皮山梔等輕清少陽法營氣傷極人參人乳  
並行陽浮不攝七味八味可選餘如因驚且鎮因怒  
宜疎飲食痰火爲實新產病後爲虛也

邵新甫

饅

陽升

某 陽升饅雜

麥冬 三錢

生地 二錢

柏子仁 一錢

川斛 三錢

茯神 三錢

黑檀豆皮 三錢

心陽熱

某 心中煩熱。頭上汗泄。汗止自安。易饅

淮小麥

栢子仁

茯神

炙草

南棗

辰砂

血虛

程氏 血虛心饅咽哈

生地

天冬

麥冬

女貞子

肝陰虛

某氏經半月一至夜餽痛

生白芍

炙草

茯神

麻仁

生地

阿膠

天冬

茯神

白芍

丹參

餽有虛實真偽其病總在於胃。經云飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺又云脾與胃以膜相連耳。又云脾主爲胃行其津液者也。由此觀之脾屬陰主乎血胃屬陽主乎氣胃易燥全賴脾陰以和之脾易濕必賴胃陽以運之故一陰一陽互相表裏合冲和之德而爲後天生化之源也。若脾陰一虛

則胃家飲食遊溢之精氣全輸於脾。不能稍留津液。以自潤。則胃過於燥而有火矣。故欲得食。以自資。稍遲則饋雜愈甚。得食則饋可暫止。若失治。則延便閉。三消噎膈之症。治當補脾陰。養營血。兼補胃陰。甘涼濡潤。或稍佐微酸。此乃脾陰之虛。而致胃家之燥也。更有一切熱病之後。胃氣雖漸復。津液尚未充。亦有是症。此但以飲食調之。可以自愈。此二種乃爲虛饋症。所謂實者。年歲壯盛。脾胃生發之氣。與腎陽充旺。食易消磨。多食易饑。而饋得食即止。此非病也。不必服藥。以上皆是真饋症。所云僞者。因胃有痰火。以致

飲食輪化不清。或現惡心吞酸發煩。眩暈少寐。似饑非饑。雖飽食亦不能止。此乃痰火爲患。治宜清胃。稍佐降痰。苦寒及膩滯之藥不宜多用。又有胃陽衰微。以致積飲內聚。水氣泛溢。似有凌心之狀。淒淒戚戚。似酸非酸。似辣非辣。飲食減少。此屬脾胃陽虛。治宜溫通。微痰飲門而治之。此二種乃似饑之偽症。若夫所云心饑者。誤也。心但有煩而無饑。胃但有饑而無煩。亦不可不辨明之。今先生之法。僅有四案。倘好善之士。更能搜採補入。則幸甚。華融雲。



# 三消

腎火

計四能食善飢渴飲日加癯瘦心境愁鬱內火自燃乃消症大病

生地

知母

石膏

麥冬

生甘草

生白芍

煩勞心  
宮熱

王五八肌肉瘦減善飢渴飲此久久煩勞壯盛不覺體衰病

發皆內因之症自心營肺衛之傷漸損及乎中下按脈偏於左搏營絡虛熱故苦寒莫制其烈甘補無濟其虛是中上消之病

肝陽化胃

又固本加甜沙參

楊二  
肝風厥陽上冲眩暈犯胃為消

石膏

知母

阿膠

細生地

生甘草

生白芍

某液涸消渴是臟陰為病。但胃口不醒生氣易振陽明

陽土非甘涼不復肝病治胃是仲景法

人參

麥冬

粳米

佩蘭葉

川斛

陳皮

犀角 三錢

鮮生地 兩一

玄參心 錢二

鮮白沙參 錢二

麥冬 二錢

柿霜 一錢

生甘草 分四

鮮地骨皮 錢三

胡五元陽變動為消與河間甘露飲方 河間甘露飲

錢十陽動消燥甘緩和陽生津

生地 炙黑甘草 知母 麥冬

棗仁 生白芍

楊六渴飲煩飢。漉溺渾濁此屬腎消陰精內耗陽氣上燔

舌碎絳赤乃陰不上承非多熱宜此乃臟液無存豈是

平常小恙

熟地 萸肉 山藥 茯神

牛膝 車前

某脈左數能食 六味加二冬龜版女貞旱蓮川椒

腎陰虛  
心火亢

王四

形瘦脈搏渴飲善食乃三消症也古人謂入水無味

不長入火無物不消河間每以益腎水制心火除腸胃

激烈之燥濟身中津液之枯是真治法玉女煎

姜三

五經營無有不勞心心陽過動而腎陰暗耗液枯陽愈

熖灼比入火之物必消燐乾枯是能食而肌肉消瘠用

景岳玉女煎

三消一症雖有上中下之分其差不越陰虧陽亢津

涸熱淫而已攷古治法唯仲景之腎氣丸助真火蒸

化上升津液本事方之神効散取水中鹹聚之物遂

其性而治之二者可謂具通天手眼萬世準繩矣他

如易簡之地黃引子朱丹溪之消渴方以及茯苓丸  
黃芪湯生津甘露飲皆錯雜不一毫無成法可遵至  
先生則範於法而不蹈於法如病在中上者照膜之  
地而成煩原之場卽用景岳之玉女煎六味之加二  
冬龜甲旱蓮一以清陽明之熱以滋少陰一以救心  
肺之陰而下頭真液如元陽變動而爲消燥者卽用  
河間之甘露飲生津清熱潤燥養陰甘緩和陽是也  
至于壯水以制陽光則有六味之補三陰而加車前  
牛膝導引肝腎斟酌變通斯誠善矣 都滋九

# 脾痺

中虛伏熱

某無形氣傷熱邪蘊結不飢不食豈血分臃滯可投口甘一症內經稱為脾痺中焦困不轉運可知

川連

淡黃芩

人參

枳實

淡乾薑

生白芍

某

口甜是脾胃伏熱未清宜用溫胆湯法

川連

山梔

人參

枳實

花粉

丹皮

橘紅

竹茹

生薑

口甘一症。內經謂之脾瘴。此甘非甘美之甘。瘴即熱之謂也。人之飲食入胃。賴脾真以運之。命陽以腐之。譬猶造酒。蒸釀者然。倘一有不和。肥甘之疾。順發五液。清華失其本來之真味。則滔滔之甜味。上泛不已也。胃脘必痞。口舌必膩。不飢不食之由。從此至矣。內經設一蘭草湯。其味辛。足以散結。其氣清。足以化濁。除陳解鬱。利水和營。爲奇方之祖也。夾暑夾溼之候。每兼是患。以此爲君。參以苦辛之勝。配合瀉心等法。又如胃虛穀少之人。亦有是症。又當宗大牛夏湯。及六君子法。遠甘益辛可也。邵新甫

脾瘕症經言因數食甘肥所致。蓋甘性緩肥性膩。使脾氣過鬱。致有口甘內熱中滿之患。故云治之以蘭。除陳氣也。陳氣者。卽甘肥釀成陳腐之氣也。夫蘭草卽爲佩蘭。俗名爲省頭草。婦人插於髻中。以辟髮中油膩之氣。其形似馬蘭而高大。其氣香。其味辛。其性涼。亦與馬蘭相類。用以醒脾氣。滌甘肥也。今二案中雖未曾用。然用人參以助正氣。餘用苦辛寒以開氣。泄熱枳實以理氣滯。亦祖蘭草之意。卽所謂除陳氣也。此症久延。卽化燥熱。轉爲消渴。故前賢有膏粱無厭發癰疽熱燥所致。淡薄不堪生腫脹。寒濕而然之。



論余於甘肥生內熱一症悟出治胃寒之一法。若貧人淡薄茹素。不因外邪。亦非冷飲停滯。其本質有胃寒症者。人皆用良薑。丁香。華撥。吳萸。乾薑。附子等。以溫之。不知辛熱剛燥。能散氣。徒使胃中陽氣逼而外泄。故初用似效。繼用則無功。莫若漸以甘肥投之。或稍佐鹹溫。或佐酸溫。凝養胃陽。使胃脂胃氣日厚。此所謂藥補不如食補也。又有腎陽胃陽兼虛者。曾見久服鹿角膠而愈。卽此意也。未識高明者。以爲然否。

華輔雲

瘧瘧

# 瘧

孫陰氣先傷陽氣獨發猶是伏暑內動當與金匱瘧瘧

同例

竹葉

麥冬

生地

玄參

知母

梨汁

蔗漿

施發熱身痛咳喘暑濕外因內阻氣分有似寒慄皆肺

病也

竹葉

連翹

薄荷

杏仁

滑石

鬱金汁

又微寒多熱。舌心乾。渴飲。尿不爽。此屬瘧瘧。治在肺經。

杏仁

石膏

竹葉

連翹

半夏

橘紅

程陰氣先傷。陽氣獨發。有瘧熱無寒之慮。

鮮生地

知母

麥冬

竹葉心

滑石

唐未病形容先瘦。既病暮熱早涼。猶然行動安舒。未必

真正重病傷寒也。但八九日病來小愈。驟食粉糲腥麪。

當宗食穀發熱。損穀則愈。仲景未嘗立方。此腹痛洞瀉。

食滯阻其腸胃。大腑不司變化。究其病根。論幼科體具

純陽。瘦損於病前。亦陽亢為消燥。仲景謂瘧瘧者。單熱。

不寒本條云陰氣孤絕陽氣獨發發熱灼煩冤令人消燥肌肉亦不設方但云以飲食消主之嘉言言主以甘寒生津可愈重後天胃氣耳洞瀉既頻津液更傷苦寒多餌熱仍不已暮夜昏譫自言胸中格拒腹中不和此皆病輕藥重致陰陽二氣之殘備法當停藥與穀諒進甘酸解其煩渴方有斟酌

又鼻煤唇裂舌腐頻與苓連然不肯已此病本輕藥重於攻擊致流行之氣結閉不行鬱遏不通其熱愈甚上則不嗜飲不納食小溲頻利便必管痛三焦皆閉神昏痰凝有諸

連翹心

錢三

鮮石蓴

加汁一錢

川貝母

錢三

杏仁

粒二十

射干

二分

淡竹葉

半錢

又

自停狼藥日有向愈之機。胃困則痞悶不欲食。今雖

未加餐。已知甘美。皆離之漸也。童真無下虛之理。洩瀉

欲出尿管必痛。良由肺津胃汁。因苦辛燥熱烈氣味。劫

奪枯槁。腸中無以運行。庸醫觀此。必以分利。所謂泉源

既竭。當滋其化源。九竅不和。都屬胃病。

麥門冬

錢二

甜杏仁

錢四

甜水梨皮

錢三

蔗漿

一木

張

舌赤煩汗不寐。肢體忽冷。乃穉年癰瘡。暑邪深入所

致。

杏仁

滑石

竹葉

西瓜翠衣

知母

花粉

又

熱甚而厥。幼穉瘧症皆然。

竹葉石膏湯去人參半

夏加知母

某

風溫陽瘧

杏仁

滑石

連翹

黃芩

青蒿

淡竹葉

丁

脉右數左小弱面明。夏秋伏暑。寒露後發。微寒多熱。

嘔逆身痛。蓋素有痰火。暑必挾濕。病自肺經而起。致氣

不宣化不飢不食。頻溺短縮。乃熱在氣分。當與溫瘧同

例忌葛柴足六經藥

桂枝白虎湯加牛夏

胡按仲景云脉如平人但熱無寒骨節煩疼微嘔而渴者病名溫瘧桂枝白虎湯主之桂枝白虎湯

蓋今年夏秋久熱口鼻吸暑其初暑邪輕小不致病發秋深氣涼外束裏熱欲出與衛營二氣交行邪與二氣遇觸斯爲熱起臨解必有微汗者氣邪兩泄然邪不盡則混處氣血中矣故聖人立法以石膏辛寒清氣分之伏熱佐入桂枝辛甘溫之輕揚引導涼藥以通營衛兼知母專理陽明獨勝之熱而手太陰肺亦得秋金肅降之司甘草粳米和胃陰以生津此一

舉兼備方下自註云一劑知二劑已。知者謂病已知其對症已者中病當愈之稱耳。

鄧寒少熱多胸中痞脹溫邪未解謾言止截。

淡黃芩 炒半夏 薑汁 生白芍

草菓 知母 烏梅

又照前方去半夏薑汁加鱉甲

吳間日寒熱目黃口渴溫邪兼雨濕外薄爲瘧。

滑石 杏仁 白蔻仁 淡黃芩

半夏 鬱金

又脉數舌紅口渴熱邪已入血分。



竹葉

石膏

生地

丹皮

知母

青蒿梗

又

飲食不節腹中不和瘧邪攻胃

鮮首烏

烏梅肉

生鱉甲

黃芩

丹皮

草菓

知母

送保和丸二錢

又

人參

生穀芽

枳實汁

茯苓

廣皮

炒半夏

朱

舌黃煩渴身痛心腹中熱躁暑熱不解爲瘧經言暑

脈自虛皆受從前疲藥之累瘵

石膏

知母

生甘草

炒粳米

麥冬

竹葉

何勞倦傷氣。遺洩傷陰。暑邪變癰。熾則煩冤最盛。分解使邪勢輕。參朮芪附。皆固閉邪氣也。

草果仁

知母

淡黃芩

川貝母

青蒿

花粉

馮 暑傷氣分。上焦先受。河間法至精至妙。後醫未讀其書。焉能治病臻效。邪深則瘧來日遲。氣結必胸中混濛如痞。無形之熱。漸蒸有形之痰。此消導發散。都是劫津。無能去邪矣。

石膏

杏仁

半夏

厚朴

知母

竹葉

黃 脉數目眇黃舌心乾白黃胎口中粘膩腕中痞悶不思納穀由於途次暑風客邪內侵募原營衛不和致發瘧疾夫暑必兼濕濕也熱也皆氣也氣與邪搏則清濁交混升降自阻古稱濕遏必熱自生矣聖帝論病本乎四氣其論藥方推氣味理必苦降辛通斯熱氣痞結可開消導攻滯香燥泄氣置暑熱致病之因於不治不識何解

川連

黃芩

花粉

桔梗

白蔻仁

鬱金

橘紅

六一散

又苦降能驅熱除濕。辛通能開氣宣滯。已經見效。當減其製。仍祖其意。

川連

桔梗

白蔻仁

厚朴

茵陳

茯苓皮

銀花

白通草

胡  
問口瘡。痰多。脘悶。汗多。心熱。伏暑內熾。忌與風寒表藥。

滑石

黃芩

厚朴

杏仁

通草

白蔻

半夏

瓜蘖皮

知母

又

黃芩

草果

知母

半夏

生白芍

烏梅

汪氏 微冷熱多。舌白脘悶嘔惡暑穢過募原爲瘧。

杏仁

鬱金

滑石

厚朴

黃芩

炒半夏

白蔻

橘紅

某 舌白脘悶寒起四末渴喜熱飲此濕邪內蘊脾陽不  
主宣達而成濕瘧。

厚朴

一錢

杏仁

一錢

草果仁

一錢

半夏

一錢

茯苓

三錢

廣皮白

一錢

某五 滯止面浮漸及脘腹。

苡仁

桑白皮

茯苓

大腹皮

薑皮

廣皮

某間癰寒熱俱微此屬濕癰

杏仁 三錢

厚朴 一錢

桂枝木 五分

飛滑石 三錢

草果 八分

炒半夏 一錢

茯苓皮 三錢

綿茵陳 半錢

牛八寒來喜飲熱湯發熱後反不渴間癰已四十日今雖

止不飢不思食五味入口皆變初病舌白乾嘔濕邪中

於太陰脾絡濕鬱氣滯喜熱飲暫通其鬱邪蒸濕中生

熱六腑熱灼津不運行至大便艱秘此為氣痺濕結當

薄味緩調令氣分清肅與脾約似同但仲景氣血兼治

此病却專傷氣分

炒黃半夏

生益智仁

綿茵陳

廣皮

厚朴

茯苓

又。瘧止。舌白。不飢。大便旬日不通。此皆留邪。堵塞經腑。隧道之流行。久延必致腹脹癥瘕。

杏仁

白蔻仁

半夏

厚朴

生香附汁

廣皮

茯苓皮

接服牛疏丸二錢

某。脈右弦左弱。留邪未盡。大便粘稀。最防轉痢。較七八日前。勢減一二。但去疾務盡。苦辛寒逐其蘊伏。而通利小便。亦不可少。

草果

知母

厚朴

茯苓

木通

滑石

轉身痛。舌白。口渴。自利。此濕溫客氣爲瘧。不可亂投柴葛。仲景有濕家忌汗之律。

飛滑石

杏仁

鬱金

淡黃芩

白蔻仁

防已

又濕甚爲熱。心痛。舌白。便糖。治在氣分。

竹葉心

麥冬

鬱金

菖蒲

飛滑石

橘紅

化服牛黃丸

又心下觸手而痛。自利。舌白。煩躁。都是濕熱阻氣分。議

開內閉。用瀉心湯。

川連

淡黃芩

乾薑

半夏



人參

枳實

又神氣稍清。痛處漸下。至臍。濕傷在氣。熱結在血。吐衄帶血。猶是上行爲逆。熱病瘀留。必從下出爲順。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

白芍

炒查肉

費 舌白渴飲。身痛嘔惡。大便不爽。診脈濡小。乃暑濕從口鼻入。濕甚生熱。四末擾中。瘧發腕痞脹痺。當以苦辛寒清上微邪。不可謂遺泄而病。輒與溫補助邪。

黃芩

知母

白薇

鬱金

薑皮

厚朴

杏仁

半夏

薑汁

石膏

又 厥泄口渴餘熱尚熾

人參

知母

石膏

竹葉

甘草

麥冬

又 熱緩不飲食津液受燥當和胃生津

人參

五味

知母

橘紅

炒白芍

半夏麴

張 瘡家濕癰忌用表散 蒼朮白虎湯加草果

曹 寒從背起汗泄甚面無淳澤舌色仍白邪未盡正先

怯心虛痙震恐亡陽厥脫議用仲景救逆法加參

又 舌絳口渴汗泄癰來日晏寒熱過多身中陰氣大傷

剛補勿進。議以何人飲。

人參

何首烏

孫陽虛之體。伏暑成瘧。涼藥只宜少用。身麻屬氣虛。用生薑瀉心法。

半夏

生薑汁

茯苓

炙甘草

南棗肉

沈陽微復瘧。

桂枝

當歸

黃芪

防風

鹿角屑

薑汁

南棗

范三五勞瘧入陰。夏月陽氣發泄。仍然勞苦經營。以致再來。

不愈。用藥以辛甘溫理陽爲正。但未易驟效耳。

人參

當歸

肉桂

炙草

川蜀漆

生薑

南棗

方

寒甚於背陽脉衰也。

人參

鹿茸

炒當歸

炙草

鹿角霜

官桂

鱉甲煎丸

吳大

背寒。舌白粉胎。知飢食無味。此爲無陽。溫中下以托

邪

生白朮

厚朴

桂枝

附子

草果仁

茯苓

又

照方去茯苓。加人參炙草生薑。

程 寒熱經月不止。屬氣弱留邪。以益氣升陽。

補中益氣湯

又

生鹿茸

鹿角霜

人參

歸身

茯苓

炙草

生薑

某

氏

建中法甚安。知營衛二氣交餒。夫太陽行身之背。瘡

發背冷。不由四肢。是少陰之陽不營太陽。此汗大泄不

已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎歟。議用桂枝加熟附子湯。

人參桂枝湯加熟附子

華

氏

二十歲。天癸始通。而黃汗泄。內熱外冷。先天既薄。瘡

傷不復。內經謂陽維爲病。苦寒熱。綱維無以振頓。四肢

骨節疼痛。通入脉以和補。調經可以却病。

淡從蓉

鹿角霜

當歸

川芎

杜仲

小茴

茯苓

香附

顧氏

進護陽方法。請症已減。寒熱未止。乃久病陽虛。脉絡

未充。尚宜通補為法。

人參

生鹿茸

當歸

紫石英

茯苓

炙草

煨薑

大棗

又經邪不盡。寒熱未止。緣瘧久。營衛氣傷。脉絡中空。乏  
屬進補法。僅能填塞絡中空隙。不能驅除蘊伏之邪。擬  
進養營法。取其養正邪自却之意。

人參

當歸

杞子

生白芍

茯神

桂心

炙草

遠志

煨薑

南棗

袁 軀

脉弦緩寒戰甚則嘔吐噫氣腹鳴漉洩是足太陰脾

寒也且苦辛寒屢用不效俱不對病反傷脾胃

人參

半夏

草果仁

生薑

新會皮

醋炒青皮

又 靈樞經云。中氣不足。溲便爲變。况老年人驚恐憂勞。

深夜不得安寐。遂致寒戰瘧發。當以病因而體貼諦視。

其爲內傷實屬七八。見瘧通套已屬非法。若云肺瘧。則

秋涼不發。何傳及於冬。今小雪當以勞瘧稱之。夫勞必

傷陽氣宜乎四末先冷。瘧邪傷中爲嘔惡腹鳴矣。用薑飲。

又陽陷入陰。必目瞑欲寐。寒則肉腠筋骨皆疼。其籩籩護衛太怯。杳不知飢。焉得思穀。老年人須血氣充溢。使邪不敢陷伏。古賢有取升陽法。

嫩毛鹿角 人參 當歸 桂枝 炙甘草

又前議勞傷陽氣。當知內損邪陷之理。凡女人天癸既絕之後。其陰經空之。豈但營衛造偏之寒熱而已。故溫脾胃及露薑治中宮營虛。但畏寒不知熱爲牝瘧。蓋牝爲陰。身體重着。亦是陰象。此辛甘理陽。鹿茸自督脈以



照提非比。蓋附但走氣分之剛暴。驅邪益虛。都在營分。  
奇經曰。陽維脈爲病。發寒熱也。

鹿茸

鹿角霜

人參

當歸

淨桂

茯苓

炙薑

又

正氣和營。瘧戰已止。當小其製。

人參

鹿茸

當歸

炒杞子

沙苑

茯苓

炙薑

某

糖後。脾腎陽虛。便溏畏寒。肢體疲倦。當防腫脹。

附子

白朮

茯苓

澤瀉

苡仁

生薑

大棗

某 陰瘧已亂汗多

桂枝

牡蠣

生黃芪

炙草

歸身

五味

煨薑

大棗

某 脉沉舌白呃忒時時煩躁而係陽虛痰飲瘧發三次

卽止此邪窒不能宣越並非邪去病解今已變病陰沍

痰濁阻塞於中致上下氣機不相維續並勢險篤拾通

陽一法無方可擬必得中陽流通瘧症復作庶有愈機

淡附子

一錢

生草果仁

半錢

生白芍

三錢

茯苓

三錢

生厚朴

一錢

薑汁

五分

一劑

此冷香真武合劑

某 伏暑胃涼發瘧以羌防蘇慈辛溫大汗汗多衛陽大

胃受暑濕

此方係白芍藥水

三

傷胃津亦被劫乾致渴飲心煩無寐診脉左弱右促目微黃嗜酒必中虛穀少易於聚濕蘊熱勿謂陽傷驟補微內經辛散太適當食甘以緩之

大麥仁 炙草 炒麥冬 生白芍

茯神 南棗

又藥不對症先傷胃口宗內經辛苦急急食甘以緩之仲景謂之胃減有不飢不欲食之患議用金匱麥門冬湯避胃汁以開痰飲仍佐甘藥取其不損陰陽耳金匱麥門冬湯去棗米加茯神糯稻根鬚

又脉右大間日寒熱目背微黃身痛此平素酒濕挾時

邪流行經脉使然。前因辛溫大汗。所以輕養胃。今脉  
症既定。仍從瘧門調治。

草果

知母

人參

枳實

黃芩

半夏

薑汁

脾胃虛

項瘡已過月。形脉俱衰。平素陽虛。虛則邪難解散。腹脹  
是太陰見症。治從脾胃。

人參一錢

半夏二錢

生於朮

錢二

茯苓二錢

草果仁二錢

錢二

淡薑

一錢

陳邪伏於裏。積久而發。道路已遠。未能日有寒熱。汗出  
不解。攻表無謂。平昔肌垂。骭痛。必有濕痰阻。隧舌白不

言才下...  
喜飲治在太陰陽明

炒半夏

厚朴

草果

知母

薑汁

杏仁

某

遺泄損陰。瘧熱再傷陰。聲嘶火升。乃水源不充。易怒

神躁。水不涵木之象。用何人飲。佐清陰火。

製首烏

人參

天冬

麥冬

知母

茯苓

某氏

瘧已半年。今但微熱。無汗。身弱自乳。血去傷陰。此頭

痛。是陽氣浮越。心痛如飢。哺熱都是陰虛。成勞。若不斷  
乳。經去不至。為乾血。則服藥亦無用。

生地 三錢

阿膠 半錢

生白芍 一錢

炙甘草 四分

麥冬 半錢

火麻仁 一錢

粗桂枝 木三分

某 瘧後心悸氣怯便後有血是熱入傷陰用固本丸加

首烏阿膠

人參

生地

熟地

天冬

麥冬

製首烏

阿膠

某 陰液消亡小溲短赤皆瘧熱所傷不飢不納陰藥勿

以過膩甘涼養胃為穩

人參

生地

天冬

麥冬

川斛

蔗漿

另服資生丸

陰虛  
伏血分

鄭 自來陰虛有遺洩。瘧邪更傷其陰。寐多盜汗。身動氣促。總是根本積弱。不主斂攝。此養陰一定成法。

熟地

生白芍

五味

炒山藥

茯神

芡實

湖蓮肉

張 脉數。瘧來日遲。舌乾渴飲。積勞怔忡。內傷居多。致邪氣乘虛。漸劫陰氣。熱邪墜於陰。熱來小溲頻數。故汗多不解。議清陰分之熱。以救津液。

活鱉甲

知母

草果

鮮生地

炒桃仁

花粉

翁 脉左弦。暮熱早涼。汗解。渴飲。治在少陽。

青蒿

桑葉

丹皮

花粉

鱉甲

知母

沈十用力失血。無非陽乘攻絡。瘧熱再傷真陰。肌消食減。自述夏暑汗泄。頭顱脹大。都是陰虛陽升。清火皆苦寒。未必能和身中之陽也。

鱉甲

生白芍

天冬

首烏

炙草

茯神

某氏 瘧熱傷陰。小溲淋痛。

生地

鱉甲

丹皮

知母

茯苓

澤瀉



熱邪結

熱邪結肺

此言寸下裏氣

朱五癰久後陰傷湯血炒焦六味加龜甲黃柏

吳十陰癰後內熱清骨散

項陽氣最薄暑入為癰先由肺病桂枝白虎湯氣分以

通營衛為正治今中焦痞阻冷飲不適熱邪宜清胃陽

亦須扶護用半夏瀉心法

半夏 川連 薑汁 茯苓

人參 枳實

王汗出不解心下有形自按則痛語言氣窒不爽癰來

鼻準先寒邪結在上當開肺痺醫見癰治癰焉得中病

桂枝 杏仁 炙草 茯苓

乾薑

五味

又 汗少喘緩肺病也然獨心下痞結不通猶白微痛非  
仲景與堅開痞

生牡蠣

黃芩

川桂枝

薑汁

花粉

炒黑蜀漆

又 照前方去花粉加知母草果

又 鱉甲煎丸 一百八十粒

王 舌白不大渴寒戰後熱神躁欲昏而心胸飽悶更甚  
瘧係客邪先由四肢以擾中宮痰嗽嘔逆顯是肺胃體

虛邪聚閉塞不通。故神昏煩悶鬱蒸。汗泄得以暫解。營衛之邪未清。寒熱漫延無已。此和補未必中竅。按經設法爲宜。

白蔻仁

大杏仁

焦牛夏

薑汁

黃芩

淡竹葉

又寒熱瘧邪交會中宮。邪聚必脹悶嘔逆。邪散則安舒。當心胸之間。並無停食之地。夫不正之氣爲邪。穢濁爛漫。原非形質。可以攻消。苟非芳香。何以開其蒙閉之穢。濁欲小望見效。捨此捷徑。無成法可遵。道中知否耶。

牛黃丸二服

心經

樂九熱多昏譫舌邊赤舌心黃煩渴脉弱是心經熱瘧醫

投發散消導津劫液涸瘵厥至矣

犀角

竹葉

連翹

玄參

麥冬

銀花

陳前方復瘧昏迷此皆陽氣上胃救逆湯去薑加芍

又鎮逆厥止議養心脾營陰乃病後治法

人參

炙草

杞子

桂圓

炒白芍

棗仁

茯神

遠志

某三四舌白渴飲咳嗽寒從背起此屬肺瘧桂枝白虎湯

加杏仁

范 脉寸大汗出口渴伏邪因新涼而發間口瘡來議治  
手太陰

淡竹葉

大杏仁

滑石

花粉

淡黃芩

橘紅

金氏 肺癰腕痞

黃芩

白蔻仁

杏仁

橘紅

青蒿梗

白芍

張姬 暑風入肺成瘧

淡黃芩

杏仁

滑石

橘紅

青蒿梗

連翹

陳六 冷暖不調。夜熱多汗。咳嗽。忌葷腥油膩。可免疳勞。溫邪如瘧。當治手太陰。

竹葉心

麥冬

粳米

飛滑石

知母

炙草

柳 暑濕都傷氣分。不渴多嘔。寒起四肢。熱聚心膈。乃太

陰瘧也。仍宜苦辛。或佐宣解裏熱之藥。

川連

黃芩

炒牛黃

枳實

白芍

薑汁

煩躁甚。另用牛黃丸。一丸。

某 寒起嘔痰。熱久不渴。多煩中焦之邪。仍以太陰脾法。

草果

知母

生薑

烏梅

炒半夏

桂枝木

早服驚甲煎方

葛 瘧久舌白泄瀉太陰脾傷肌肉微浮宜補中却邪大  
忌消尅發散

人參

草果

白芍

茯苓

煨老薑

炙草

王 脉濡不渴嘔痰不飢是太陰脾瘧當辛溫以理中焦  
之陽

生於朮

半夏

草果

紫厚朴

茯苓

薑汁

又 太陰脾瘧必有寒濕凝阻其運動之陽所防久虛變

幻浮腫腹脹人參未能多用權以生朮代之但與絡方  
少遜佐以通藥則無礙

生於朮

桂枝朮

炒常山

茯苓

生鹿角

生薑汁

其二寒起四末湯喜熱飲屬脾瘧狀先當溫散

杏仁

厚朴

草果仁

知母

生薑

半夏

金 既成間日寒熱瘧嘔吐痰涎其瘧邪大犯脾胃故不

飢不食脉仍虛舌白治在太陰不必攻表

人參

半夏

草果

橘紅



黃芩

知母

薑汁

沈十歲脉濡寒熱瘧日遷腹微滿四肢不暖是大陰脾瘧用  
露薑飲以升陽

人參 一錢

生薑 一錢

露一宿溫暖服

華 用動藥瘧止新沐瘧來陽弱失衛外邪直侵入裏試  
以瘧來不得汗邪不從外解大著

川桂枝

炮黑川烏

生白朮

炒黑蜀漆

全蝎

厚朴

薑汁丸

王五暑濕傷氣瘧久傷陰食穀煩熱愈加邪未盡也病已  
一月不飢不飽大便秘阻仍有潮熱全是津液暗傷胃

口不得匙。醒甘寒清熱。佐以酸味。胃氣稍振。清補可投。

麥冬

乾首烏

烏梅肉

知母

火麻仁

生白芍

高陰虛。溫瘧雖止。而腰獨痛。先理陽明胃陰。俾得安穀。

再商治腎

北沙參

麥冬

木瓜

蜜水炒知母

大麥仁

烏梅

周舌白。脉小。暑邪成瘧。麻黃劫汗。傷陽遂變痿症。今痰

鹹有血。右脇痛。引背部。不知飢飽。當先理胃津。

大沙參

桑葉

麥冬

茯神

生扁豆 苡仁

胃逆不降

楊

高年瘧熱劫胃汁遂不飢不飽不食不便渴不嗜飲

味變酸濁藥能變胃方匙

人參 川連 枳實 牡蠣

淡乾薑 生薑

徐 脉數左寸大關弦瘧後食大輩太早胃氣受傷不得

下降致痞悶惡心痰多唇燥大便不利俱是脾氣不宜

之象擬進溫膽湯法以和胃氣

炒焦竹茹 炒焦半夏 草果仁 生枳實

杏仁 橘紅 金斛 花粉

肝胃

黃 瘧後不飢咽卽吐此脫膈痰與氣阻胃不降則不受

納。做溫膽湯意佐以苦味降逆。

鮮竹茹

枳實

炒半夏

茯苓

橘紅

川連

苦杏仁

鬱金汁

李 不飢口湧甜水瘧邪未清肝胃不和

川連

乾薑

枳實

瓜蒌仁

半夏

廣皮白

薑汁

又 口湧甜水脾痺

川連

黃芩

厚朴

半夏

生乾薑

廣皮

煎送脾約丸

又 橘半枳木丸

金寒自背起。衝氣由臍下而升。清涎上湧。嘔吐遂飢。不能食。此瘧邪深藏厥陰。邪動必犯陽明。舌白形寒。寒勝都主胃陽之虛。然徒補鈍守無益。

人參

半夏

廣皮白

薑汁

川椒

烏梅

附子

生乾薑

方 先厥而瘧。蚊蟲下出。嘔逆腹鳴。脫痛室寒。此厥陰瘧疾。勿得亂治。

川連

淡乾薑

薑汁

川桂枝

生白芍

烏梅肉

黃芩

秋露水煎藥

又陽微寒勝瘧久不已理胃陽以壯中宮使四末之邪不令徒犯脾胃

人參

炒牛夏

生薑

烏梅

草果

炒常山

秋露水煎

又辛酸兩和脾胃已效

人參

草果

生薑

生白芍

烏梅

炙紫甲

吳體豐色白陽氣木虛夏秋伏暑挾痰飲爲瘧寒熱夜作邪已入陰冷汗頻出陽氣益傷今診得脉小無力言白虛象已著恐延厥脫之慮擬進救逆湯法

人參

龍骨

牡蠣

炙草

桂枝木

炒蜀漆

煨薑

南棗

又 問。逆陽氣偏泄。今年久熱傷元。初瘡發散。不能去病。便是再劫胃陽。致邪入厥陰。昏冒大汗。思肝腎同屬下焦。厥陽挾內風。胃厥吐涎沫。膠痰陽明胃中久寒熱。戕擾空虛若谷。風自內生。問醫藥不分。經辨症。但以稱虛道實。宜乎鮮有厥效。議用仲景安胃泄肝一法。

人參

川椒

烏梅

附子

乾薑

桂枝

川連

生牡蠣

生白芍

又

諸症畧減。寒熱未止。尚宜實陽。

爲法。

人參

炒牛夏

淡乾薑

桂枝木

茯苓

生牡蠣

又天暴冷。陽傷泄瀉。脉得左手似數而堅。口微渴。舌仍白。陰液既虧。飲水自救。非熱熾也。議通塞兩用。冀其寒熱再緩。

人參

淡附子

桂枝木

茯苓

生牡蠣

炒黑蜀漆

蔡惡進穀食。舌乾。腿脹不飢。不知味。寤多寐。少皆由瘧汗嘔逆。都令諸陽交升。胃氣不降。則不食。陽不下潛。則無寐。肝風為震。則火升。心熱法當和胃。陽平肝氣。肝平



胃。必穀進能寢矣。

知母

北沙參

麥冬

新會皮

烏梅肉

新穀露沖

金

五七

強截瘡。裏邪病結。心下水飲。晝嘔吐。無餘病在胃。

口之上。老年陽衰。防其呃厥。舍瀉心之外。無專方。

人參

枳實

乾薑

半夏

川連

黃芩

又

舌白。氣衝心痛。噎噤味酸。嘔吐涎沫。皆胃虛肝乘。攸

仲景胃中虛客氣上逆。可與旋覆花代赭石湯。

旋覆花

代赭石

人參

半夏

茯苓

薑汁

粳米

又諸恙向安。寢食頗逸。平昔肝木易動。左脈較右脈略長。味變酸木傷土。秋前宜慎。

人參

半夏

茯苓

廣皮

生穀芽

生白芍

腸瘕半月不止。左脇下已有瘕母。寒熱時必氣痞嘔逆。乃肝邪乘胃。有邪陷厥陰之象。擬進瀉心法。

川連

黃芩

乾薑

半夏

人參

枳實

朱女厥陰衝氣上攻。眩暈間瘕。安胃丸三錢。枳梅湯送。

陳氏據母是瘧邪入絡與血氣扭結必凝然不動今述過

冷勞怒衝氣至腕痛必嘔逆必三日氣降痛緩而後水

飲得入此厥逆之氣由肝入胃衝脉不和則經水不調

延胡

川楝子

半夏

蓬朮

蒲黃

五靈脂

薑汁

韓二瘧不止欲吐

炒半夏

半錢

厚朴

一錢

青皮

一錢

炒焦知母

半錢

草果仁

一錢

橘紅

一錢

臨服調入薑汁一錢

吳

背寒瘧來漸晏邪有入陰之意此伏邪不肯解散都

因久積煩勞未病先虛也飲水少腹如墜腕中痞結不

舒中焦。屢受邪。迫陽氣先已餒弱。議兩和太陰陽明法。

草果

知母

牛夏

厚朴

薑汁

烏梅

黃芩

花粉

又進兩和陰陽。寒熱已止。診脉右濡。明是氣衰。宜和胃生津。使餘邪不攻自解。

人參

知母

炙繁甲

生白芍

烏梅肉

大麥仁

炒丹皮

又脉左數。舌絳。暮渴。

炒麥冬

人參

首烏

白芍

丹皮

茯神

另更衣丸二錢

陸六口湧清涎不飢不食寒熱邪氣交會中焦脾胃日困

半夏

薑汁

茯苓

厚朴

炒常山

草果

烏梅

又

大半夏湯加草果烏梅

凌三瘧久脾胃氣傷不食倦怠半年不肯復元論理必用  
參朮益氣但貧窘豈能久用然久延不甦倘腹滿浮腫  
便難調治白朮膏加砂仁末

某三瘧邪由四末以擾中宮脾胃受傷無疑但寒暑更遷  
病邪既久臟腑真氣自衰兩年來納穀不運漸覺衰微  
不耐風冷之侵竝無疑痰聚氣見疴此必胸中宗氣自

餒致清陽不司轉運當以仲景苓桂朮甘湯

又六君子湯去甘草加檀香泥桂枝朮

吳 瘧已復瘧。溺溺淋瀝。群年脾瘧。食物不與。色黃。腹膨  
有滯。脾胃愈衰。東垣云。中氣不足。溲便乃變。初秋交冬。  
迭加反覆。久則五疳勞瘵。當慎於食物。令脾胃氣靈可  
效。宗脾胃論升降疎補法。

人參

茯苓

炙草

麝皮

使君子

神麴

查肉

麥芽

澤瀉

祝 此勢傷陽氣。更感冷熱不正之氣。身熱無汗。肢冷腹  
熱。自利。舌灰白。微嘔。顯然太陰受病。診脈小右濡不飢。

入夜昏謔語。但如寐。不加狂躁。論脾爲柔臟。體陰用陽。治法雖多。從未及病。當遵前輩。冷香縮脾遺意。

人參

益智仁

茯苓

新會皮

生厚朴

以仁

木瓜

砂仁

又。脈右弦。來去不齊。左小。裏弱。舌邊紅。舌心白黃微絳。鼻冷。四肢冷。熱時微渴。不飢。不想食。前議太陰脾臟受病。瘧邪從四末乘中。必脾胃受病。鼻準四肢皆冷。是陽氣微弱。因病再傷。竟日不暖。但形肉消燦。不敢剛劫攻邪。以宣通脾胃之陽。在陰伏邪。無發散清熱之理。

人參

草果

炒牛夏

生薑

茯苓

新會皮

蒸烏梅肉

二帖後加附子後又加牡蠣

吳七十瘧傷脾胃腹中不和脉右濇食入脹甚前方通調氣血佐以泄木服之積滯既下痛隨利減仍宜制木安土不可作陽虛溫補治

生於朮

川連

椒目

麥芽

雞肫皮

廣皮

厚朴

沙山查

附五

陳四六瘧邪由四末以擾中皆陽明厥陰界域陽明衰則厥陰來乘津液少斯內風必動昔賢以麻屬氣虛木是濕痰敗血今戊亥頻熱行走沐汗頭然液虛陽動風生脂



液不得灌溉。肢末非濕痰氣分之恙。

冬桑葉九蒸 熟首烏 黑芝蔴 柏子仁 茯神

當歸 杞子 菊花炭 蜜丸

李 脉左弦。嘔吐發熱後。腕中痞悶不爽。宜慎口腹。清肅

上中二焦。不致再延成瘧。進苦辛法。

杏仁 鬱金 山梔 豆豉

白朮 枳殼

孫 高年發瘧。寒熱夜作。胸悶不欲食。煩渴熱頻。最慮其

邪陷為厥。進陽旦法。

桂枝 黃芩 花粉 生白芍

生左牡蠣

煨薑

南棗

姬

瘧脉沉清中脫痞結此屬裏症用瀉心法

半夏

川連

橘紅

枳實

黃芩

生薑汁

又

脉沉右關大瘧未止寒熱子後作煩渴中悶不欲食

醋炒半夏

杏仁

黃芩

花粉

草果

生薑

陸

瘧截虛氣痞結成身痛

桂枝

炒焦半夏

薑汁

廣皮白

當歸

茯苓

錢氏暑熱傷氣成癰胸痞結嘔吐痰涎皆熱氣之結前此瀉心法極是

人參汁

枳實汁

黃連

黃芩

炒半夏

杏仁

厚朴

薑汁

汪此濕熱與水穀交蒸全在氣分嘗得三焦分消清解既成間日瘧疾邪正互爭原無大害初悞於混指傷寒六經再謬於參朮守補致邪瀰漫神昏喘急妄譫痙瘳皆邪無出路內閉則外脫求其協熱下利已不可得診脈細澹按腹膨滿夫痞滿屬氣燥實在血今洞利後而如腹滿諸氣皆結豈非閉塞而然潰敗決裂至此難望

# 挽救

細葉草蒲根汁 二錢

草果仁 五分

茯苓皮 三錢

紫厚朴 一錢

綿茵陳 三錢

辰砂益元散 五錢

連翹心 牛一錢

金銀花三錢

另用牛黃丸一服用涼開水緩緩以茶匙銼化服

潘氏伏邪發熱。脈後成瘧。間日一至。咳嗽痰多。惡心中痞。

其邪在肺胃之絡。振進苦辛輕劑。

杏仁

黄芩

半頁

橘紅

白堊

# 花粉

程氏脈右大寒熱微嘔。腕痞不納。四末瘡邪。變於中宮。當

苦辛泄降酸苦泄熱邪勢再減二三必從清補可愈

川連 炒牛夏 薑汁 黃芩

知母 草果 炒厚朴 烏梅肉

毛氏用玉女煎寒熱未已渴飲仍然惡已減周身皆痛  
診脉兩手俱數舌色灰白邊赤汗泄不解擬用酸苦泄  
其在裏熱邪務以癰止再調體質

黃芩 黃連 草果 白芍

烏梅 知母 用秋露水煎藥

又寒熱由四末以裡中官胃口最當其戕害熱悶不飢  
胃傷邪留清熱利痰固為要法但有年氣弱兼之病經

匝月清邪之中必佐補正議用半夏瀉心法

人參

半夏

黃連

黃芩

枳實

薑汁

方 勞瘕再發

人參

草果

生薑

烏梅

秋露水煎

又 補中益氣湯加草果知母薑棗

陳 紹虛則痛陽微則脹左脇有瘕母邪留正傷此勞瘕

人參

當歸

肉桂

焦朮

炙草

茯苓

黃皮

生薑

南棗

四劑後用五苓散一服

此藥難

某 勞瘡畏寒下虛不納 六味加肉桂五味

某 瘡未止熱陷下痢中瘡不欲食

人參 川連 黃芩 生白芍 廣皮

炒當歸 炒山查 乾薑 枳實 銀花

又 瘡後勞復

人參 當歸 白芍 棗仁

茯神 廣皮 生薑 南棗

氣血凝

范 一脉小滿病起瘧後食物不和仍誦讀煩勞遂至左脇

連及少腹當有厥起或攻胃脘或聚腹中凝着膜脹古

語六瘡不離乎肝膽亦猶咳不離乎肺也蓋肝得邪助

木勢張揚中上必然受傷本氣自怯運納之權目滅清  
陽既少展舒漸陰口跳漸爲痞滿上年溫養辛甘久進  
未見病去其治體之法諒不能却自述靜處病加煩動  
小安其爲氣血久阻爲鬱議用通絡法以病根由瘡久  
邪留絡中耳

紫降香 桃仁

小香附

淡薑渣

神麴

雞肫皮

南山查

韭根汁法丸

高

瘡發既多邪入於絡絡屬血分汗下未能逐邪仲景

製鱉甲煎丸一法搜剔絡中留伏之邪五六日必效

早午暮各服七粒



某 瘧邪經月不解。邪已入絡。絡聚血邪。攻則血下。究竟  
寒熱煩渴。目黃舌膩。溺赤短少。全是裏邪未清。凡膠重  
宜禁蔬食。不助邪。選閱醫藥。柴葛攻表。消導通便。與瘀  
無與。用仲景鱉甲煎丸。朝十粒。午十粒。黃昏十粒。開  
水送。

賈 瘧邪迫傷津液。胃減不飢。腸燥便紅。左脇微堅。有似  
瘵母結聚。當宣格熱。以肅餘邪。

生地 知母 丹皮 麻仁 生鱉甲

某氏 瘧邪內陷。變成陰瘧。久延成勞。務以月經通爽。不致  
邪劫乾血。

產母

生驚甲

一兩

桃仁

三錢

炒丹皮

一錢

穿山甲

三錢

查肉

一錢半

生香附

一錢半

顯

左脇有瘰母乃氣血交結之故治宜通絡

驚甲

桃仁

金鈴子

牡蠣

丹皮

夏枯草

江

遠客水土各別胃受食物未和更遭嗔怒動肝木犯

胃土瘰傷脇中有形瘰聚三年宿恙氣血暗消但久必

入血湯藥焉能取效宜用緩法以疎通其絡若不追援

致陽結陰枯釀成噎膈難治矣

生驚甲

桃仁

麝香

麝香

韭白根粉

歸鬚

郁李仁

冬葵子

熬膏

吳二瘡反覆左脇瘡母

生蟹甲

生牡蠣

炒桃仁

當歸鬚

炒延胡

柴胡稍

桂枝木

炒查肉

青皮

某夏秋濕熱瘡。正虛邪留。混入血絡。結成癰疽瘡母。

夫濕氣熱氣。本屬無形。醫治非法。血脈蘊邪。故寒熱間

發。仲景立法。務在緩攻。急則變爲中滿。得之。兼服蟹甲

煎丸

知母

草果

半夏

黃芩

烏梅

生薑

秋露水煎

金一經年老瘡左脇已結瘡母邪已入絡與氣血膠結成  
形區區表裏解散之藥焉得入絡通血脈致發其邪以  
辛香是絡病大旨

生牡蠣

三錢

歸鬚

一錢

桃仁

二錢

桂枝

五分

炒蜀漆

一錢

公丁香

三粒

某三八少陰三瘡已久當升陽溫經

鹿茸

熟附子

人參

粗桂枝

當歸

炒黑蜀漆

呂四陰瘡一年方止羸瘦妨食食人不運不飲湯水四肢  
無力診脈微弱不鼓屢進六君益氣無效瘡重溫寒通陽

從火生土意

人參

熟附子

生益智

茯神

白芍

生薑

吳四 三瘧愈後反覆寒多有汗勞則陽洩致瘡謹護陽却邪

川桂枝

熟附子

生於朮

炙草

生薑

南棗肉

某 陰虛汗多下焦冷用升陽法

人參

鹿茸

桂枝木

當歸

炙甘草

生薑

大棗

邪

邪深留陰三日始有瘧疾但熱來必神昏譫妄是膈中震動所致議定未病兩日日進清心牛黃丸一服試看後期瘧至何如

肝

氏三日瘧一年有餘勞則欲發內熱素有結痞今長大攻走不定氣逆欲嘔酸經閉四載當厥陰陽明同治

半夏

川連

乾薑

吳萸

茯苓

桂枝

白芍

川

烏梅

脾

蔡三五瘧不食不納惡心渴喜熱飲診脈沉細脾陽困頓不能送邪外出治以四獸飲

沈二三瘧腹脹不渴嘔水邪在脾胃之絡濕疎裏邪勿用

常發七日月經不調

羌

表散

草果

粗桂枝

生薑

厚朴

炒蜀漆

茯苓

又

溫脾通胃得效。

生於朮

淡附子

川桂枝

炒黑蜀漆

厚朴

生薑

某<sup>四</sup>五

三歲經年。至今復受濕邪及發日來舌白脛間渴喜

熱飲當溫太陰。

杏仁

草果

知母

桂枝

半夏

生薑

厚朴

烏梅

唐九三瘰癧發用露蜂法寒止熱盛加入烏梅五分取其

酸味以和陰謂其瘰久陰亦傷耳

胡陰瘰癧傷脾胃用苦辛溫得效瘰未已腹脹便秘議  
理中陽

人參

益智

木香

茯苓

厚朴

廣皮

生薑

錢三週勞瘰癧數年初起卽三陰此傷損已在臟陰之絡

最難速效甘溫益氣久進益氣湯

某四三瘰癧早截中陽室寒脫服不效背寒肢冷

草果仁

杏仁

半夏

茯苓



桂枝

厚朴

廣皮

生薑

某脉滿而黃舌白。腕中格拒。湯水皆嘔。三日瘥。至按色脉診。乃是太陰陽微。飲結。當以溫藥和之。

半夏

草薢

丁香柄

草薢

厚朴

薑汁

和氣血

李初病勞倦。胸熱。投東垣益氣湯。未嘗背謬。而得湯反劇。聞穀氣穢。間日瘥。來渴思涼飲。此必暑邪內伏。致營衛週流與邪觸。臂為寒熱分爭矣。故甘溫益氣。升舉脾胃氣血。與暑熱異岐。胃中熱灼。陽土愈燥。上脫不納。虛結。便閉。其初在經在氣。其久入絡入血。由陽入陰。間日

經爲三瘧奇脉。踴維皆被邪傷。內經謂陽維爲病。苦寒熱也。維爲一身綱維。故出四末寒凜而起。但仍是脉絡爲病。故參芪朮附不能回陽以益其虛。歸桂地芍無能養營以却邪矣。昔軒岐有刺瘧之旨。深慮邪與氣血混成一所。汗吐下無能分其邪耳。後漢張仲景推廣聖經。蘊奧謂瘧邪經月不解。勢必邪結血中。有癥瘕瘧母之累。瘵製方。鱉甲煎丸。方中大意。取用蛭蟻。有四。意謂飛者升走者降。靈動迅速。追拔沉混氣血之邪。蓋散之不解。邪非在表。攻之不驅。邪非着裏。補正却邪。正邪並樹無益。故聖人另闢手眼。以搜剔絡中混處之邪。治經千

百歷有明驗服十二日干支一週倘未全功當以升其八脉之氣由至陰返於陽位無有不告安之理

某陰瘧兩月或輕或重左脇按之痠痛邪伏厥陰血絡恐結瘕母議通絡以逐邪用仲景鱉甲煎九每早服三十粒當寒熱日勿用

昌二三瘕皆邪入陰絡故汗下爲忌經年瘕能瘕聚母仍聚季脇邪攻血氣之結攻逐聚聚升降以通陰陽乃仲景成法但診脉細微食減神衰攻法再施恐擾中滿前與溫補通陽頗安然守中之補始緩爲宜

人參

當歸

淡附子

淡乾薑

茯苓

肉桂

鯢甲膠丸

諸瘧由伏邪而成。非旦夕之因爲患也。六淫之氣。惟燥不能爲害。而新涼收束。實屬有關。考之聖訓。獨手三陽手厥陰。却無其症名。醫者當辨其六氣中所傷何氣。六經中病涉何經。若小柴胡專主少陽。豈能兼括也。夫溫瘧。瘧瘧。瘧痰。食瘧。癘諸瘧。皆有成方。予不復贅。但此症春月及冬時間有。惟夏秋暑濕爲患者居多。暑必挾濕。而傷氣分。第一要分別其上焦中焦之因。暑濕二氣何者爲重。若暑熱重者。而究上焦肺臟清氣。瘧來時必熱重而寒微。唇舌必絳赤。煩渴而喜

涼飲飲多無痞滿之患其脉色自有陽勝之候。當宗  
桂枝白虎法及天水散加辛涼之品爲治。若濕邪重  
者當議中焦脾胃陽氣。痞來時雖則熱勢蒸燔。舌必  
有粘膩之苦。渴喜爰湯。胃脘覺痞脹。嘔惡其脉色自  
有陽氣不舒之清狀。當宗正氣散及二陳湯去甘草。  
加杏蔻生薑之類。土之必要陽勝於陰。而後配和陽  
之劑。日後方無貽累。倘症象兩兼。則兩法兼之可也。  
大凡此症。若邪氣輕而下不甚虛者。寒熱相等。而作  
止有時。邪氣重而正氣怯者。寒熱模糊。來勢必混而  
不分。又云邪淺則一日一發。邪稍深則間日一發。邪

最深則三日一發。古稱爲三陰大瘧。以肝脾腎三臟之見症爲要領。其補瀉寒溫亦不離仲景治三陰之法爲根蒂。可知陽經輕淺之方治之無益也。所云移早則邪達於陽。移晏則邪陷於陰。陰陽勝復於此可叅。若久而不已。必有他症之虞。大陰之虛浮脹滿。有通補之理。中法開臍之五苓湯。少陰之痿弱成勞。有滋陰之復脉湯。溫養之升奇法。厥陰之厥逆吐衄。及邪結爲瘧母。有烏梅丸與蠶甲煎法。又如心經瘧久。理必勢必動及其營。則爲煩渴見紅之累。肺經瘧久。理必傷及其津。則爲胃秘腸痺之候。一則涼陰爲主。一則

清降爲宜。然而瘧之名目不一。而瘧之兼症甚多。若不達權通變。而安能一一盡善。卽如暑濕格拒。三焦而嘔逆不納者。宗半夏瀉心法。穢濁蒙蔽膈中而清靈昧甚者。用牛黃清心丸。心陽暴脫有龍蟄之救逆。胃虛嘔呃。有旋覆代赭之成方。如表散和解通陽補氣。滋陰化營。搜邪入絡。勦藥截。辛酸兩和。營氣血補。及陽瘧之後養胃陰。陰瘧之後理脾陽等法。已全備矣。某集諸家融通無拘。所謂用藥如用兵。先生不愧良工之名也。鄒新甫

# 泄瀉

周 因長夏濕熱食物失調所謂濕多成五泄也先用胃

苓湯分利陰陽。胃苓湯去甘草

溫 長夏濕勝爲瀉。腹鳴瀉少腑陽不司分利。先宜導濕

和中。胃苓湯

又 向年陰分傷及陽位。每有腹滿便澀。長夏入秋常有

滯下。此中焦氣分積弱。水穀之氣易於聚濕。或口鼻觸

入穢邪。遂令脾胃不和。是夏秋調攝最宜加意。擬夏秋

應用方備錄。天暖氣蒸南方最易有中痧痞脹諸恙。未受



病前心懷疑慮卽飲芳香正氣之屬毋令邪入爲第一義

藿香梗

白蔻仁

橘紅

桔梗

杏仁

鬱金

降香

厚朴

夏至後熱勝濕蒸氣傷神。鑒用東垣益氣湯若汗出口渴兼生脉散飲液

某秋暑穢濁氣從吸入寒熱如瘧上咳痰下洞泄三焦蔓延小水短赤。議芳香辟穢分利滲濕

藿香

厚朴

廣皮

茯苓塊

甘草

猪苓

澤瀉

木瓜

滑石

檀香汁

又進藥稍緩所言穢濁非臆說矣其陰莖囊腫是濕熱甚而下墜入腑與方書莖欬症有間議河間法

厚朴

杏仁

滑石

寒水石

石膏

猪苓

澤瀉

絲瓜葉

某陰瘡久傷成損俛不能卧脊強脉垂足跗浮腫乃督脉不用漸至僂僂廢疾近日暑濕內侵泄瀉先宜分利和中

厚朴

藿香

廣皮

茯苓

澤瀉

木瓜

炒扁豆

炒查肉

炒砂仁

蔡

氣短少續爲虛近日腹中不和泄瀉暑傷先以清暑

和脾預防滯下。

厚朴

廣皮

炙草

茯苓

澤瀉

炒扁豆

麥芽

木瓜

炒查肉

砂仁

又香砂異功散

葉

五

平素操持積勞。五志之火易燃。上則鼻衄堵塞。下有

肛痔腸紅。冬春溫邪。是陽氣發越。邪氣乘虛內伏。夫所

伏之邪。非比暴感。發散可解。况兼勞倦內傷之體。病經

九十日來。足跗日腫。大便日行五六次。其形粘膩。其色

黃赤紫滯。小便不利。必隨大便而稍通。此腎關樞機已

廢。二腸腸腑失司。所進水穀脾胃不主運行。釀濕墜下。

轉爲癰腐之形。正當土旺入夏脾胃主氣。此濕熱內淫。由乎脾腎日傷。不得明理之醫。一誤再誤。必致變現腹滿矣。夫左脉之緩濇。是久病陰陽之損。是合理也。而右脉弦大。豈是有餘形質之滯。卽仲景所云弦爲胃減。大則病進。亦由陽明脉絡漸弛。腫自下日上之義。守中治中有妨食滋滿之弊。大旨中宜運通。下宜分利。必得小溲自利。腑氣開闔。始有轉機。若再延綿月餘。夏至陰生。便難力挽矣。四苓加椒目厚朴益智廣皮白。

又服分消方法五日。瀉減溺通。足跗浮腫未消。要知脾胃久困濕熱滯濁。無以運行。所進水穀。其氣蒸變爲濕。

濕勝多成五瀉欲使濕去必利小便然滲利太過望六  
年歲之人又當慮及下焦久病入夏正脾胃司令時候  
脾臟宜補則健胃腑宜疎自清扶正氣驅濕熱乃消補  
兼施治法 晚服資生丸炒米湯送下

服早

人參

廣皮

防已

厚朴

茯苓

生朮

澤瀉

神麴

黃連

吳萸

濕熱

朱

口腹不慎濕熱內起泄瀉復至此濕多成五泄氣瀉

則腹脹矣

人參

茅朮

川連

黃芩

白芍

廣皮

茯苓

澤瀉

查肉

陳 脉緩大腹痛泄瀉小溲不利此水穀內因之濕鬱蒸腸胃致清濁不分若不清理分消延爲積聚粘膩滯下議用苓芍湯

淡黃芩

生白芍

廣皮

厚朴

藿香

茯苓

猪苓

澤瀉

張 脉緩瀉腹滿痛瀉不爽氣鬱滯久濕凝在腸用丹溪小溫中丸

針砂

小川連

蒼朮

白朮

香附

半夏

廣皮

青皮

神麴漿丸

程 診脉肝部獨大脾胃緩弱平昔納穀甚少而精神頗

好其先天充旺不待言矣。目今水瀉。少腹滿脹。少腹爲厥陰肝位。由陰陽不分。濁踞於下。致肝失疎泄。當以五苓散導水利濕。倣古急開支河之法。

黃九歲久瀉兼發瘡。瘡是濕勝熱鬱。苦寒必佐風藥。合乎東垣脾宜升胃宜降之旨。

人參 川連 黃柏 廣皮 炙草 生於朮

羌活 防風 升麻 柴胡 神麴 麥芽

朱三形瘦尖長。木火體質。自上年泄瀉。累用脾胃藥不效。此陰水素虧。酒食水穀之濕下墜。陰弱不能包涵所致。宜苦味堅陰。淡滲勝濕。

炒川連

炒黃柏

厚朴

廣皮白

茯苓

猪苓

澤瀉

炒查肉

陳

寒濕已變熱鬱六腑底窒爲瀉

生白朮

厚朴

廣皮

白茯苓

益智仁

木瓜

茵陳

澤瀉

其三酒濕內聚痰飲餘濕下注五泄常川一味茅朮丸。

炒半夏

茯苓

苡仁

刺疾藜

新會皮

中暑

王氏

頭脹喜冷飲咳嘔心中脹泄瀉不爽此爲中暑故止

瀉血藥更甚舌色白議清上焦氣分。

石膏

淡黃芩

炒半夏

橘紅

臨證指南醫案

卷六

泄瀉

癸



中陽  
滯

厚朴

杏仁

王二自春徂冬。瀉白積。至今腹痛。小木不利。想食物非宜。脾胃水寒。偏注大腸。當分其勢。以導太陽。胃苓湯主之。胡三三瘧劫截不效。必是陰臟受病。衄血熱渴。食入不化。痛瀉二者相反。思病延已久。食物無忌。病中勉強進食。不能充長精神。卽爲滯濁阻痺。先以脹瀉調理。不必以瘧相混。

草果

厚朴

陳皮

木香

茯苓皮

大腹皮

猪苓

澤瀉

郁八

四經營勞心。飲食違時。飢飽勞傷。脾胃受病。脾失運化。

夜屬陰晦至天明洞瀉粘膩食物不喜脾弱惡食柔瀉  
之味五苓通膀胱分泄濕氣已走前陰之竅用之小效  
東垣謂中氣不足溲便乃變陽不運行濕多成五泄矣

人參

生白朮

茯苓

炙甘草

炮薑

肉桂

某五  
人形寒使瀉舌白

厚朴

廣皮

牛夏

茯苓皮

桂枝木

生薑

程氏  
寒濕腹痛惡心泄瀉

厚朴

藿香梗

益智仁

廣皮

炒茅朮

煨木香

茯苓

澤瀉

吳氏

寒凝胃陽腹痛泄瀉

草果

厚朴

茅朮

廣皮

吳萸

炒查肉

程氏

瀉後腹膨

人參

生益智

炮薑

茯苓

厚朴

廣皮

砂仁

陸氏

氣滯爲脹濕鬱爲瀉主以分消

炒厚朴

大腹皮

茯苓

澤瀉

生益智

廣皮

炒查肉

某氏 雨濕涼氣乘於脾胃泄瀉之後腹膨減食宜健中運濕

焦白朮炭 厚朴 廣皮 生穀芽

炒扁豆 木瓜 茯苓 厚瀉

程女 濕傳脾陽腹滿肢冷泄瀉 四苓散加厚朴廣皮

鄒婦 濕傷泄瀉小便全少腹滿欲脹舌白不飢病在足太陰脾宜溫中佐以分利

生茅朮 厚朴 草果 廣皮

茯苓 豬苓 澤瀉 炒砂仁

又 早服真武丸薑湯送二錢五分 一兩

夜服針砂丸開水送一錢五分 六錢

又 人參

附子

枳實

茯苓

乾薑

生白芍

某氏 脉沉緩。肌肉豐盛。是水土稟質。陽氣少於運行。水穀聚濕布及經絡。下焦每有重着筋痛。食稍不進。便易泄瀉。經水色淡。水濕交混。總以太陰脾虛調理。若不中藥。恐助脹病。

人參

茯苓

白朮

炙草

廣皮

羌活

獨活

防風

澤瀉

傷風 陽傷濕聚。便澹足腫。

粗桂枝 生白朮 木防己 茯苓 澤瀉

又 脉緊足腫便溇陽微濕聚氣不流暢怕成單脹

照前方加茵陳

又 晨泄肢腫

生白朮 桂枝木 淡附子 茯苓 澤瀉

陸<sup>五</sup> 當歸動氣子夜痼泄晝午自止是陽衰寒濕沍凝

陽不運每瀉則脹減宜通不宜瀉

製川烏 生白朮 茯苓 木香

厚朴 廣皮

朱 消渴乾嘔口吐清涎舌光赤泄瀉熱病四十日不愈

熱邪入陰。厥陽犯胃。右酸不思食。久延爲病。傷成勞。

川連

烏梅

黃芩

白芍

人參

訶子皮

陶十病由春木正旺。中焦受尅。先泄瀉。繼以腹痛。小便不利。食不思納。皆是六腑不和所致。夫胃爲陽土。肝屬陰木。腑宜通。肝宜柔。宜涼。治胃必佐泄肝。制其勝也。閱方呆補。不知臟腑陰陽。故辨及之。

泡淡黃芩

炒小川連

炒廣皮

厚朴

生白芍

炒烏梅肉

猪苓

澤瀉

楊 因驚而瀉。腹病欲嘔。是爲虵厥。當用酸苦。忌進甜物。

川椒

烏梅肉

川連

淡乾薑

金鈴子

延胡

桂枝木

生白芍

磨胃中不和。不飽。少寐。肝風震動。頭暈。泄瀉。高年經月。未復。兩和厥陰陽明。

炒牛夏

人參

枳實

茯苓

炒烏梅肉

滑入夜咽乾欲嘔。食納腹痛。即瀉。此胃口大傷。陰火內。風劫燥津液。當以肝胃同治。用酸甘化陰方。

人參

半錢

焦白芍

三錢

訓子皮

七分

炙草

五分

陳倉米

二錢

又去陳米加南棗一枚

又咽乾不喜湯飲。腹鳴瀉瀉。五液消燥。虛風內風。擾於。



腸胃

人參

木瓜

焦白芍

赤石脂

炙草

朱

經月減食泄瀉下焦無力以扶土泄木法

人參

焦木

炒益智

茯苓

木瓜

廣皮

某

病後陰傷作瀉

烏梅

白芍

炙草

廣皮

茯苓

荷葉

王

霍亂後痛瀉已緩心中空洞肢節痿弱此陽明脉虛

內風明燥益虛象也異功去參朮加烏梅木瓜白芍

又上吐下瀉之後中氣大虛身痛肢浮虛風內動以補中爲法異功散加木瓜薑棗

某腹鳴晨泄顛眩旋痺形質似屬陽不足診脈小弦非二神四神溫固之症蓋陽明胃土已虛厥陰肝風振動內起久病而爲飧泄用甘以理胃酸以制肝

人參

茯苓

炙草

廣皮

烏梅

木瓜

某頭痛損目黎明腸鳴泄瀉煩心必目刺痛流淚是木火生風致脾胃土位日戕姑議泄木安土法

人參

半夏

茯苓

炙草

肝犯脾  
胃

丹皮

桑葉

徐六自春季胸脇肌腠以及腹中疼痛從治肝小愈腹鳴泄瀉不止久風殄泄都因木乘土位東垣云治脾胃必先制肝倣此

人參

焦朮

炙草

木瓜

烏梅

炒芡絲餅

程勞損經年食入腹脹痛瀉心中寒凜腐膜熱蒸此陽不內潛脾胃久困萬無治嗽清降之理議用戊己湯扶土制木法

葉三左弱氣脹在皮膚之裏此絡脉中病也泄肝破氣久

服脾胃受困而為泄瀉得養中小愈然以藥治藥脈絡之病仍在

半夏

桂枝

茯苓

遠志

歸鬚

橘紅

薑棗湯泛丸

張姬 腹鳴臍脹清晨痼泄先以熄肝風安脾胃方

人參

茯苓

木瓜

炒烏梅

炒菟絲子

又泄肝醒胃方

吳萸

生白芍

炒烏梅

人參

茯苓

胆腎湯

某

脈右弦。腹膨鳴响痛瀉半年不痊此少陽木火鬱傷

脾土久則浮腫脹滿。法當疎通泄營。非辛溫燥熱可治。

黃芩

白芍

桑葉

丹皮

柴胡

青皮

脾胃陽虛

吳陽虛惡寒惡心吞酸泄瀉乃年力已衰更飲酒中虛

治法必以脾胃扶陽

人參

茯苓

附子

白朮

乾薑

胡蘆巴

趙晨泄難忍臨晚稍可寧耐易飢善食仍不易消磨其

故在乎脾胃陰陽不和也讀東垣脾胃論謂脾宜升則

健胃宜降則和援引升降為法

人參

生薑

炮附子

炙草

炒歸身

炒白芍 地榆炭 炮薑灰 煨葛根 煨升麻

又 腸風鳴震。泄利得緩。猶有微痛而下。都緣陽氣受傷。

垢滯永不清楚。必以溫通之劑為法。

生茅朮三錢 炙草五分 生炮附子一錢 厚朴一錢

廣皮一錢 製大黃五分

金五能食不化腹痛泄瀉。若風冷外乘。肌肉着冷。其病頃刻。即至上年用石刻安腎丸。初服相投。兩旬不效。知是病在中焦。不必固下矣。自述行走數十里。未覺衰倦。痛處逆勝。議用治中法。是太陰陽明主治。

生於朮 生茅朮 生益智 淡乾薑

胡蘆巴

茯苓

木瓜

萸櫞

王三  
五三年久損氣怯神奪此溫養補益皆護元以萸櫞病  
原不藉乎桂附辛熱以劫陰液今胃減咽乾大便澀泄  
經月夏三月脾胃主候宜從中治

人參

炒白芍

炙草

煨益智

炒木瓜

茯苓

廣皮

金  
冲年遺恙先天最薄夏秋瘧傷食少不運病脹澀瀉  
都是脾胃因病致虛當薄味調和進治中法

人參

益智

廣皮

茯苓

木瓜

炒澤瀉

穀芽

煨薑

李氏脉沉形寒腰髀牽強腹鳴有形上下攻觸每晨必瀉  
經水百日一至微仲景意

茯苓

炮淡乾薑

生於朮

肉桂

某氏陽微濁滯吐瀉心痛當辛溫開氣胃陽甦醒乃安

炒半夏

厚朴

廣皮

益智仁

煨木香

烏藥

香附汁

薑汁

脾陽虛

某仁色白脉爽體質陽薄入春汗泄神力疲倦大便溏洩  
不爽皆脾陽困頓不克勝舉無以鼓動生生陽氣耳刻  
下姑與和中為先

益智仁

八廣皮

一錢

薑灰

七分

茯苓

三錢

生穀芽

二錢

臨證指南醫案

卷六

泄瀉

美



楊 小便不利大便澹泄補脾法中佐以淡滲分其陰陽

人參

熟木

茯苓

象牙屑

澤瀉

苡仁

廣皮

白芍

薛三十 水穀濕邪內著脾氣不和腹膨不飢便澹四肢痠痛

厚朴

茯苓皮

大腹皮

防已

廣皮

澤瀉

苡仁

桂枝木

又 肢痠腹膨便澹

木防已

生白木

苡仁

木瓜

桂枝木

澤瀉

馬四 飲酒少穀中氣久虛晨泄下部冷腎陽脾陽兩憊知

飢少納法當理腸酒客性不喜甘膩滋柔之藥

茯苓

覆盆子

生益智

炒龍絲餅

補骨脂

灰竇

朱

目

酒濕內因脾腎陽虛用黑地黃丸蒸餅水煮和丸

徐

五

晨泄病在腎少腹有瘕亦是陰邪若食葷腥厚味病

卽頓發乃陽氣積衰議用四神丸

席

五

陰瘧初愈不慎食物清陽既微健運失司腸胃氣滯

遂爲洞泄且足跗微腫慮其腹竒欲滿夏季脾胃主令

尤宜淡薄藥以通陽爲先平時脾腎兩治

胃苓湯去白朮甘草

接服黑地黃丸去五味

朱

四

久瀉無有不傷腎者。食減不化。陽不用事。八味腎氣

乃從陰引陽。宜乎少效。議與升陽。

鹿茸

人參

陽起石

茯苓

炮附子

淡乾薑

又

久瀉必從脾腎主治。但痛利必有粘積。小溲短縮不

爽。溫補不應。議通腑氣。

厚朴

黃皮

茯苓

猪苓

澤瀉

川連

煨木香

炒山查

炒神麴

僧

五

寂泄一年。食減腹鳴。屬脾腎陽衰。近腹中微痛。兼理

氣滯。用陳無擇三

肺丸

某

背部牽掣入脇晨瀉

苓桂朮甘去甘加鹿角其藥

龔五

診脉兩關緩弱尺動下垂早晨未食心下懊懣納穀

仍不易化蓋脾陽微中焦聚濕則少運腎陰衰固攝失

司為瘕泄是中宜旋則運下宜封乃藏是醫藥至理議

早進治中法夕用四神丸

高氏

經來腹膨臍脊痠垂自秋季泄瀉不已脫肛妨食用

濟生丸不應

鹿角霜

炒菟絲餅

生杜仲

淡苳蓉

茯苓

炒苑

焦歸身

炒黑小苟

陳氏

產育十五胎下元氣少固攝晨泄自古治腎陽自下

涵蒸脾陽始得運變王氏以食下不化爲無陽凡腥膩沉着之物當忌早用四神丸晚服理中去術草加益

智木瓜砂仁

張<sup>起</sup>泄瀉脾腎虛得食脹

人參 炒菟絲子 炒黃乾薑 茯苓

煨益智 木瓜

某 瀉五十日腹鳴渴飲溲溺不利畏寒形倦寐醒汗出用溫中平木法

人參 胡蘆巴 炮薑 茯苓

訶子皮 附子 粟殼

某 脾腎不攝五更瀉

巴戟 菟絲子 五味 補骨脂 灰膏

建蓮 山藥 炙草

某 久瀉脈虛

人參 五味 禹餘糧石

張氏 產後不復腹疼疲瀉

炒菟絲餅 鹿角霜 生杜仲 淡補骨脂

炒黑小茴 炒杞子 茯苓

黃氏 因病原是勞損自三陰及於奇經第腹中氣升胃痛  
暨有形動觸衝任脈之守補則滯涼潤則滑瀉傷久瀉

寒熱最爲吃緊先固攝下焦爲治

人參

炒菟絲餅 芡實

湖蓮

茯神

赤石脂

某 腎虛痼泄

炒香菟絲子 生杜仲

炒焦補骨脂

茴香

雲茯苓

又 陽微子後腹鳴前方痼泄已止

人參

炒菟絲子 炒補骨脂

湖蓮肉

芡實

茯苓

顧 脾腎痼泄。腹膨肢腫久病大虛。議通補中下之陽

入參 川熟附 茯苓 澤瀉 炒黃連

某 腎虛疲泄乃下焦不攝純則恐傷陰液以腎惡燥也

早服震靈丹九 晚間大飲湯調服參苓白朮散

二錢 二藥服十二日

中虛

高 尿細下垂高年久咳腹痛泄瀉形神憔悴乃病傷難復非攻病藥石可愈擬進甘緩法

炙甘草 炒白芍 炒飴糖 茯苓 南棗

汪 過食泄瀉胃傷氣陷津不上涌臥則舌乾微渴且宜

薄味調攝和中之劑量進二三可安

人參 葛根 生薑芽 炙甘草



荷葉蒂

泄瀉注下痢也。經云：濕多成五泄。曰：飧曰瀉，曰鶩曰濡，曰滑，曰飧泄之完穀不化，濕兼風也。清泄之腸垢污積，濕兼熱也。鶩泄之溼清溺，曰：濕兼寒也。濡泄之身重軟弱，濕白勝也。滑泄之久下不能禁固，濕勝氣脫也。是以胃風湯治有血之飧泄，清六九療腸垢之熱。瀉驚泄，便清溺白，中有硬物，選用理中治中，滑泄脉微氣脫，洞下不禁，急投四柱六柱，飲惟濡泄有虛有實，或以胃苓或以木附，至於脾泄胃泄腎泄大腸泄小腸泄大瘕泄，黃泄鶩泄，傷酒傷食泄，古方古法條

載甚詳其急則治標必使因時隨症理固然也及其  
緩則治本惟知燥脾滲濕義有未盡者乎蓋脾同坤  
土本至靜之體而有乾健之用生萬物而役於萬物  
從水從火爲寒爲熱歷觀陽熱下利者十不得一二  
從水之寒泄者十常八九焉言當然者主治在脾推  
所以然者必求之水火因思人身水火猶權衡也一  
勝則一負火勝則水負水勝則火負五泄多濕濕水  
同氣水之盛則火之衰也於是推少陽爲三陽之樞  
相火寄焉風火易胃而熟腐五穀少陰爲三陰之樞  
龍火寓焉薰蒸臟腑而轉輸糟粕胃之納脾之輸皆

火之運也。然非雷藏龍馴。何能無燥無濕。勢有冒明。  
燎土之膏。如果土奠水安。從此不泛不流。定無清氣。  
在下之患矣。吾故曰。五泄之治。平水火者。清其源。崇  
隄土者。塞其流耳。今觀葉氏診記。配合氣味。妙在清  
新。縱橫治術。不離規矩。依然下者升。滑者固。寒者溫。  
熱者清。脈弦治風。脈濡滲濕。總之長於辨症。立方因  
而投劑。自能輒效。所謂讀古而不泥於古。採方而不  
執於方。化裁之妙。人所難能者。余友吳子翼文。昔在  
葉氏門牆。曾言先生洞達人情。諳練時務。使之應世。  
一以傑也。以故小道居此盛名。又聞其應酬之暇。好

讀兩漢出辭自必高古。惜乎著作長安不能一見金  
人嘆息不忘耳。蕭文玉